

PREDNÁŠKA 6.

DIFERENCIÁLNY POČET, POKRAČOVANIE

DERIVÁCIA INVERZNEJ FUNKCIE

Výsledok, ktorý prezentujeme v tejto časti, slúži na odvodenie vzorcov pre derivovanie inverzných funkcií.

Uvažujme o bijektívnej funkcii $f : A \rightarrow B$ a k nej inverznej funkcii $g = f^{-1} : B \rightarrow A$.

Nech bod $x_0 \in A$ a $f(x_0) = y_0$. Použijeme ešte označenie $y = f(x)$.

Ak má funkcia f v bode x_0 deriváciu, tak

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{y - y_0}{x - x_0} = k.$$

Predpokladajme, že $k \neq 0$.

Potom

$$\frac{1}{k} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{x - x_0}{y - y_0} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0}.$$

Teda inverzná funkcia má deriváciu v bode y_0 a

$$[f^{-1}]'(y_0) = \frac{1}{k}.$$

Veta (o derivácii inverznej funkcie). *Nech $f : I \rightarrow J$ je diferencovateľná a bijektívna funkcia na svojom definičnom intervale I . Nech $f'(x) \neq 0$ na I .*

Potom inverzná funkcia $f^{-1} : J \rightarrow I$ je diferencovateľná na intervale J a platí

$$[f^{-1}(y)]' = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

Príklad 1. Majme funkciu $f(x) = e^x$. Inverzná funkcia je $g(y) = f^{-1}(y) = \ln y$.

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = e^x$$

rôznu od nuly na celom $\mathbb{R}$.

Podľa vety o derivovaní inverznej funkcie je

$$g'(y) = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{e^{\ln y}} = \frac{1}{y}.$$

Príklad 2. Majme funkciu $f(x) = \sin x$ definovanú na intervale $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Inverzná funkcia je $g(y) = f^{-1}(y) = \arcsin y$, definovaná na intervale $J = (-1, 1)$.

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = \cos x,$$

ktorá je rôzna od nuly na $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Podľa vety o derivovaní inverznej funkcie je

$$g'(y) = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cos(\arcsin y)}.$$

Využitím vzorca

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

upravíme výsledok do tvaru

$$g'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin y)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Príklad 3. Majme funkciu $f(x) = \cos x$ definovanú na intervale $I = (0, \pi)$. Inverzná funkcia je $g(y) = f^{-1}(y) = \arccos y$, definovaná na intervale $J = (-1, 1)$.

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = -\sin x,$$

ktorá je rôzna od nuly na I .

Podľa vety o derivovaní inverznej funkcie je

$$g'(y) = -\frac{1}{\sin x} = -\frac{1}{\sin(\arccos y)}.$$

Využitím vzorca

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

upravíme výsledok do tvaru

$$g'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos y)}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Príklad 4. Majme funkciu $f(x) = \operatorname{tg} x$ definovanú na intervale $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Inverzná funkcia je $g(y) = f^{-1}(y) = \operatorname{arctg} y$ definovaná na R .

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x.$$

Podľa vety o derivovaní inverznej funkcie je

$$g'(y) = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} y)} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

Príklad 5. Majme funkciu $f(x) = \operatorname{cotg} x$ definovanú na intervale $I = (0, \pi)$. Inverzná funkcia je $g(y) = f^{-1}(y) = \operatorname{arccotg} y$ definovaná na R .

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \operatorname{cotg}^2 x).$$

Podľa vety o derivovaní inverznej funkcie je

$$g'(y) = -\frac{1}{1 + \operatorname{cotg}^2 x} = -\frac{1}{1 + \operatorname{cotg}^2(\operatorname{arccotg} y)} = -\frac{1}{1 + y^2}.$$

Predchádzajúce výsledky budeme v ďalšom využívať ako elementárne vzorce pre výpočet derivácie.

GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVÁCIE

Derivácia funkcie f v bode x_0 je smernicou k priamky

$$y - f(x_0) = k(x - x_0),$$

ktorú nazveme dotyčnicou ku grafu funkcie f v bode $[x_0, f(x_0)]$. Pritom $k = f'(x_0)$.

(V predchádzajúcej časti sme s pojmom dotyčnica pracovali na intuitívnej úrovni, text vyššie môžeme chápať aj ako definíciu dotyčnice ku grafu diferencovateľnej funkcie.)

Príklad 6. Vypočítajme rovnicu dotyčnice ku grafu funkcie

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}$$

v bode $A = [1, ?]$.

Riešenie. Otáznik znamená, že k určeniu bodu A stačí poznať jeho prvú súradnicu.

Vypočítajme

$$f(1) = \sqrt{2}.$$

Preto $A = [1, \sqrt{2}]$.

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1 + x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x = \frac{x}{(1 + x^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

Jej hodnota v bode 1 je

$$f'(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Rovnica dotyčnice ku grafu v bode A je

$$y - \sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - 1).$$

Výraz

$$f'(x_0)(x - x_0)$$

na pravej strane rovnice dotyčnice nazývame prvý diferenciál funkcie f v bode x_0 . Značíme ho

$$df(x, x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

Teda rovnicu dotyčnice vieme napísať v podobe

$$y = f(x_0) + df(x, x_0).$$

V približných výpočtoch sa vychádza z predstavy, že hodnota funkcie f sa blízko bodu x_0 len málo líši od hodnoty na dotyčnici a teda $df(x, x_0)$ je odhadovaný prírastok k hodnote $f(x_0)$.

Príklad 7. Vypočítajme rovnicu dotyčnice ku grafu funkcie

$$f(x) = \sin x$$

v bode $A = [\frac{\pi}{6}, ?]$ a napíšme 1. diferenciál funkcie f v bode $\frac{\pi}{6}$.

Riešenie.

Vypočítajme

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Preto $A = [1, \frac{1}{2}]$.

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = \cos x.$$

Jej hodnota v bode $\frac{\pi}{6}$ je

$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Rovnica dotyčnice ku grafu v bode A je

$$y - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

Prvý diferenciál v bode $\frac{\pi}{6}$ je

$$df\left(x, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

Príklad 8. Vypočítajme rovnicu dotyčnice ku grafu funkcie

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2-3}$$

v bode $A = [?, -\frac{3}{2}]$ a napíšme 1. diferenciál funkcie f príslušnom bode.

Riešenie.

Teraz je neznáma prvá súradnica bodu dotyku A .

Počítajme

$$f(x) = \frac{2x+1}{x^2-3} = -\frac{3}{2}.$$

Riešením tejto rovnice je

$$2x+1 = -\frac{3}{2}(x^2-3),$$

a teda

$$\frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{7}{2} = 0.$$

Korene tejto kvadratickej rovnice sú $x_1 = 1$ a $x_2 = -\frac{7}{3}$.

Preto budeme uvažovať o dvoch bodoch dotyku $A_1 = [1, -\frac{3}{2}]$ a $A_2 = [-\frac{7}{3}, -\frac{3}{2}]$.

Funkcia f má deriváciu

$$f'(x) = \frac{2(x^2-3) - (2x+1)2x}{(x^2-3)^2} = \frac{-2x^2 - 2x - 6}{(x^2-3)^2}.$$

Jej hodnota v bode $x_1 = 1$ je

$$f'(1) = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2}.$$

Rovnica dotyčnice ku grafu v bode A_1 je

$$y + \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}(x - 1).$$

Prvý diferenciál v bode 1 je

$$df(x, 1) = -\frac{5}{2}(x - 1).$$

Rovnicu dotyčnice v bode A_2 a prvý diferenciál v bode $-\frac{7}{3}$ vypočítame analogicky.

Hodnota derivácie v bode $x_2 = -\frac{7}{3}$ je

$$f'(-\frac{7}{3}) = -\frac{45}{22}.$$

Rovnica dotyčnice ku grafu v bode A_2 je

$$y + \frac{3}{2} = -\frac{45}{22} \left(x + \frac{7}{3} \right).$$

Prvý diferenciál v bode $-\frac{7}{3}$ je

$$df(x, -\frac{7}{3}) = -\frac{45}{22} \left(x + \frac{7}{3} \right).$$

V niektorých fyzikálnych a technických aplikáciach sa používa približný výpočet založený na nahradení krivky jej dotyčnicou v okolí bodu dotyku. Tento proces sa nazýva linearizácia.

Pretože dotyčnica dobre vystihuje diferencovateľnú funkciu len v okolí bodu dotyku, aj metóda linearizácie sa používa len na „malom” okolí tohto bodu.

Hovoríme, že linearizácia je lokálna metóda.